

3.1. Pacienta novērtēšanas veidlapa (piemērs)

ABS punkti		Agrīnās brīdināšanas skala		Pacienta identifikācija											
0 1 2 3		Nodaļa	Palāta												
				Datums											
				Laiks											
A+B Elpošana X/min	≥ 25	3													
	21 - 24	2													
	18 - 20														
	15 - 17														
	12 - 14														
	9 - 11	1													
A+B SpO ₂ Skala 1 saturācija %	≥ 96	3													
	94 - 95	1													
	92 - 93	2													
	≤ 91	3													
	≥ 97 uz O ₂	3													
	95 - 96 uz O ₂	2													
SpO ₂ Skala 2 saturācija % Lieto, ja mērķa saturācija ir 88 - 92% Tikai ar ārsta nozīmējumu	93 - 94 uz O ₂	1													
	≥ 93 gaiss														
	88 - 92														
	86 - 87	1													
	84 - 85	2													
	≤ 83%	3													
Skābeklis vai gaiss	G = Gaiss														
	O ₂ L/min	2													
	Ierīce														
C Asinsspiediens mmHg Skalā izmanto tikai sistolisko asinsspiedienu	≥ 220	3													
	201 - 219														
	181 - 200														
	161 - 180														
	141 - 160														
	121 - 140														
	111 - 120														
	101 - 110	1													
	91 - 100	2													
	81 - 90														
	71 - 80														
	61 - 70	3													
	51 - 60														
	≤ 50														
C Pulss X/min	Diast.AS														
	≥ 131	3													
	121 - 130	2													
	111 - 120	2													
	101 - 110	1													
	91 - 100	1													
	81 - 90														
	71 - 80														
	61 - 70														
	51 - 60														
	41 - 50	1													
	31 - 40	3													
	≤ 30														
	D Apziņa. AVPU skala + Apjukums vertēts, ja nav hronisks	A - modrs													
Agjukums		3													
V - uz skatu															
P - uz sāpēm		3													
T Temperatūra °C	U - nereaģē														
	≥ 39.1	2													
	38.1 - 39.0	1													
	37.1 - 38.0														
	36.1 - 37.0														
	35.1 - 36.0	1													
ABS punkti KOPĀ:	≤ 35.0	3													
Novērtēšanas biežums															
Aprūpes eskalācija Jā/Nē															
Iniciāli															
Piezīmes															

ABS punkti	Monitorēšanas biežums	Klīniskais risks	Klīniskā atbildība
0	Kā minimums vienu reizi 12 h	Zems	Turpina rutīnas monitorēšanu ABS
1 - 4	Kā minimums ik 4 - 6 stundas	Zems	Māsa novērtē pacientu, pieņem lēmumu par monitorēšanas biežumu, aprūpes eskalāciju
3 punkti vienā parametrā	Kā minimums ik pēc 1 h	Vidēji zems	Informē ārstu, pieņem lēmumu par aprūpes eskalāciju
5 - 6	Kā minimums ik pēc 1 h	Vidējs	Nekavējoties informē ārstu. Arsts nekavējoties apskata pacientu. Veic atkārtotu novērtēšanu, pieslēdz pacientu monitoram. Ja pacienta stāvoklis 30-60 min laikā neuzlabojas, ITN ārsta konsultācija
7 un vairāk	Turpināt monitorēt vitālās pazīmes	Augsts	Zilais kods, pacientu pārvēd uz ITN

13.attēls. ABS dokumentācijas veidlapas piemērs (Autoru izstrādāts, pēc Royal College of Physicians, 2017) dokumentācijas parauga)